

# CALCIUM STAR

**ΚΟΚΚΩΔΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ & ΑΖΩΤΟΥ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ.**

*Για τη βασική λίπανση των καλλιεργειών, ειδικά για τα όξινα εδάφη, εδάφη με έλλειψη ασβεστίου και καλλιέργειες που απαιτούν ασβέστιο.*

**20-5-5+2MgO + Ca (CaCO<sub>3</sub> 15 - CaO 8)**

**25-12-0+5MgO + Ca (CaCO<sub>3</sub> 20 - CaO 10)**

**20-10-0+ Ca (CaCO<sub>3</sub> 17 - CaO 9)**

**15-30-0+ Ca (CaCO<sub>3</sub> 26 - CaO 14)**

**16-8-0+ Ca (CaCO<sub>3</sub> 22 - CaO 12)**

**6-10-20+4MgO+ Ca (CaCO<sub>3</sub> 10 - CaO 6)**

**Ca**

**Mg**

## ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

- ✓ Τα λιπάσματα **CALCIUM STAR** είναι ενισχυμένα με σημαντική ποσότητα αφομοιώσιμου ασβεστίου (CALCIUM) και είναι κατάλληλα **για τα όξινα εδάφη** (έχουν τη δυνατότητα να εξουδετερώνουν την οξύτητα του εδάφους η οποία μπορεί να επιφέρει δυσμενή αποτελέσματα σε πολλές καλλιέργειες αλλά και τοξικότητα γενικότερα), **τα εδάφη που υποφέρουν από έλλειψη ασβεστίου** και τις καλλιέργειες που είναι ευαίσθητες στην έλλειψη του στοιχείου αυτού.
- ✓ Τα λιπάσματα **CALCIUM STAR** περιέχουν **ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, Άζωτο (N) και Φώσφορο (P) ή Άζωτο (N), Φώσφορο (P) και Κάλιο (K)** στην ιδανική ποσότητα και αναλογία για τα σιτηρά. Τα προϊόντα αυτά είναι Υψηλής Αφομοιωσιμότητας και σε μορφές **Ελεγχόμενης Αποδευμευσης**. Αποδίδονται αργά και σταθερά και αξιοποιούνται από την καλλιέργεια.
- ✓ Περιέχουν **ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)**, ή **ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)** και **ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)** σε υψηλά ποσοστά, όπως και όλα τα θρεπτικά **ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ** βάση του κανονισμού της Ευρωπαϊκής **Κοινότητας (ΒΟΡΙΟ (B), ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co), ΧΑΛΚΟΣ (Cu), ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe), ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn), ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Mo), ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn))** που έχουν κριθεί απαραίτητα για τη σωστή θρέψη των φυτών.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

**Στη βασική λίπανση των καλλιεργειών,**

Επιλέγετε έναν από τους τύπους ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και την ηλικία της, βλαστικό στάδιο. Εφαρμογή πριν την σπορά ή τη φύτευση και κατά τη διάρκεια του χειμώνα για τις πολυετείς, δενδρώδεις καλλιέργειες.

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

**Γενική δοσολογία: 10-60 κιλά/στρ.**

Η ακριβής ποσότητα εφαρμογής, προσδιορίζεται βάση των ελλείψεων που μπορεί να έχει το έδαφος και η καλλιέργεια, βάση των προγραμματισμένων εφαρμογών άλλων ανόργανων, οργανικών λιπασμάτων και βάση του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας.