

# POWER CaS

**ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ-ΘΕΙΟΥ,  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ**



## ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαφυλλικό Λίπασμα Ασβεστίου-Θείου, Βρέξιμη Σκόνη, κατάλληλο και για χρήση στις Βιολογικές Καλλιέργειες (Καν.834/2007 Ε.Ε.)

- ✓ **Βελτιώνει την ποιότητα των καρπών (χρώμα, μέγεθος, συνεκτικότητα) και την ικανότητα συντήρησης των καρπών.**
- ✓ **Ενισχύει την αντοχή των δένδρων και των καρπών σε ασθένειες και εχθρούς.**
- ✓ **Αυξάνει τη γονιμότητα των ανθέων της επόμενης χρονιάς.**

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι θερινοί ψεκασμοί να γίνονται αργά το απόγευμα. Στον κάδο προετοιμασίας του ψεκαστικού υγρού βάζουμε ποσότητα νερού που ο όγκος του δεν υπερβαίνει το μισό του όγκου του σκευάσματος (**POWER**). Ρίχνουμε (σιγά, σιγά) την ποσότητα του σκευάσματος που απαιτείται. Συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρις ότου το σκεύασμα γίνει κρέμα. Αφήνουμε το σκεύασμα να ηρεμίσει λίγα λεπτά. Συμπληρώνουμε νερό αναδεύοντας, μέχρις ότου εκτιμήσουμε ότι μπορεί να μεταγγισθεί στο βυτίο του ψεκαστικού. Προετοιμάζουμε την επόμενη δόση. Το βυτίο καλό είναι να έχει σήτα και αναδευτήρα.

Εάν προηγηθεί ψεκασμός με λάδια ή captan εφαρμόζεται το προϊόν εφόσον περάσουν 15 ημέρες.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα. Συνδυάζεται με πυρεθρίνες.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

**POWER CaS** εφαρμόζεται διαφυλλικά με ψεκασμό:  
**Διαφυλλικά: 4-15** κιλά στα 1000 κιλά νερό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ	ΘΕΙΟ (S)	Ασβέστιο (Ca)	βοηθητικές ουσίες
Βάρος/όγκο %	40%	20%	✓

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ POWER CaS ANA ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

### Ροδακινιά:

1. Τον Νοέμβριο, στην πτώση των φύλλων: 12-15 κιλά/1000 λίτρα νερού
2. Το Φεβρουάριο-Μάρτιο: 6-7,5 κιλά/1000 λίτρα νερού
3. Πριν την έκπτυση των φύλλων, στο φούσκωμα οφθαλμών: 7 κιλά/1000 λίτρα νερού
4. Πριν την έναρξη της ανθοφορίας, στο ροζ μπουμπούκι: 3 κιλά/1000 λίτρα νερού

### Ακτινιδιά:

1. Τέλη Οκτωβρίου, μετά τη συγκομιδή: 7-8 κιλά/1000 λίτρα νερού
2. Το Φεβρουάριο-Μάρτιο: 10-15 κιλά/1000 λίτρα νερού
3. Τέλη Απριλίου και κάθε 15-20 ημέρες: 5 κιλά/1000 λίτρα νερού

### Μηλιά & Αχλαδιά:

1. Τον Νοέμβριο, στην πτώση των φύλλων: 12-15 κιλά/1000 λίτρα νερού
2. Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο: 12-15 κιλά/1000 λίτρα νερού
3. Στην πράσινη κορυφή: 7 κιλά/1000 λίτρα νερού
4. Στη ρόδινη κορυφή: 3 κιλά/1000 λίτρα νερού
5. Στην πτώση πετάλων και κάθε 20-30 ημέρες: 3 κιλά/1000 λίτρα νερού

### Κερασιά, Αμυγδαλιά, Δαμάσκηνα & Βερικοκιά:

1. Τον Νοέμβριο, στην πτώση των φύλλων: 12-15 κιλά/1000 λίτρα νερού
2. Το Δεκέμβριο-Ιανουάριο: 15 κιλά/1000 λίτρα νερού
3. Το Φεβρουάριο-Μάρτιο: 7 κιλά/1000 λίτρα νερού

### Ελιά:

1. Μετά τη συγκομιδή, τον Οκτώβριο: 7 κιλά/1000 λίτρα νερού
2. Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο: 7 κιλά/1000 λίτρα νερού
3. Τον Μάρτιο-Απρίλιο: 5 κιλά/1000 λίτρα νερού
4. Τον Ιούνιο-Ιούλιο: 3 κιλά/1000 λίτρα νερού

### Αμπέλι:

1. Πριν το κλάδεμα: 10-15 κιλά/1000 λίτρα νερού
  2. Μετά το κλάδεμα: 7 κιλά/1000 λίτρα νερού
  3. Σε όλη τη διάρκεια της Άνοιξης και του Καλοκαιριού: 3 κιλά/1000 λίτρα νερού
- Οι ψεκασμοί να σταματούν 30 ημέρες πριν την συγκομιδή

### Σπαράγγι:

1. Στο θερισμό, το Φθινόπωρο: 15 κιλά/1000 λίτρα νερού
2. Όταν βγει η καλλιέργεια πάνω και κάθε 15-20 ημέρες: 5 κιλά/1000 λίτρα νερού

### Εσπεριδοειδή:

Σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ψεκασμοί με 3 κιλά/1000 λίτρα νερού

### Μεγάλες Καλλιέργειες, Θερμοκήπια, Κηπευτικά & Ανθοκομία:

Σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ψεκασμοί με 3 κιλά/1000 λίτρα νερού.